Física y Tecnología Energética

2 - Energía.

Concepto en la Física Clásica

Energía

Diccionario R.A.E. Lengua

- 1. Eficacia, poder, virtud para obrar
- 2. Fuerza de voluntad, vigor y tesón en la actividad
- 3. Causa capaz de transformarse en trabajo mecánico

Etimología.

- Del griego *enérgeia* 'fuerza en acción, actividad' derivado de *érgon* 'obra, acción'

Diccionario R.A. Ciencias

- Capacidad para realizar trabajo.

pero....

no toda la energía puede transformarse en trabajo

(2º principio de la Termodinámica)

Energía. Unidades

Trabajo $W = \int \vec{F} d\vec{r}$

Donde la fuerza es la causa de los cambios en el movimiento

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

Potencia

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dE}{dt}$$

Unidad del Sistema Internacional

Julio $1 \text{ J} = 1 \text{ N}\cdot\text{m}$

- $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$
- $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$
- $1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ}$
- $1 \text{ kpm} = 9,81 \text{ J}$
- $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $1 \text{ tec} = 1 \text{ tce} = 0,7 \text{ tep} = 2,9 \times 10^{10} \text{ J}$
- $1 \text{ tep} = 1 \text{ toe} = 10^7 \text{ kcal} = 4,18 \times 10^{10} \text{ J}$
- $1 \text{ m}^3\text{GN} = 3,8 \times 10^7 \text{ J}$
- $1 \text{ ton TNT} = 4,18 \times 10^9 \text{ J}$
- $1 \text{ ft}\cdot\text{lbf} = 1,3558 \text{ J}$
- $1 \text{ Btu} = 1055 \text{ J}$
- $1 \text{ therm} = 10^5 \text{ Btu} = 1,055 \times 10^8 \text{ J}$
- $1 \text{ quad} = 10^{15} \text{ Btu} \approx 10^{18} \text{ J}$
- $1 \text{ atm}\cdot\text{L} = 101,3 \text{ J}$

Watio $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$

- $1 \text{ cal/s} = 4.18 \text{ W}$
- $1 \text{ ft}\cdot\text{lbf/h} = 3,76 \times 10^{-4} \text{ W}$
- $1 \text{ Btu/h} = 0,293 \text{ W}$
- $1 \text{ HP} = 550 \text{ ft}\cdot\text{lbf/s} = 745,7 \text{ W}$
- $1 \text{ CV} = 75 \text{ m}\cdot\text{kp/s} = 735,5 \text{ W}$

Mecánica Clásica

- El efecto de las fuerzas (Newton, Galileo)

-a lo largo del tiempo: Impulso

$$\vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta(m\vec{v})$$

variación de la cantidad de movimiento

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

-a lo largo de la trayectoria: Trabajo

$$W = \int \vec{F} d\vec{r} = \Delta\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

variación de la energía cinética

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

o de la 'fuerza viva' de Leibnitz

$$mv^2$$

Energía que se tiene en función del movimiento.

- En las colisiones se conserva $\vec{p}$ (principio de acción y reacción)

Descartes " La cantidad de movimiento total del universo es una cantidad fija "

- En las colisiones elásticas también se conserva E_c

en las inelásticas no. (Trabajo de deformación = ΔE_c)

Conservación de la Energía Mecánica

- Campo de fuerzas conservativo . $\vec{F}(\vec{r})$

Según la posición **Energía potencial** $\Delta E_p = \int -\vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$
trabajo que hay que hacer contra el campo de fuerzas para mover un cuerpo.

Energía que se tiene en función de la posición dentro de un campo de fuerzas.

Gravitatoria: $E_p = -G \frac{Mm}{r} = mgh$ Elástica: $E_p = \frac{1}{2} kx^2$

- Si únicamente hay fuerzas conservativas se **conserva la energía total**

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2} mv^2 + mgh$$

Ejemplo: péndulo o muelle oscilando.

La energía se transforma de cinética a potencial y viceversa.

- La energía está indeterminada en su valor absoluto.
- Si hay fuerzas no conservativas, (deformación, fricción, rozamiento)

no se conserva $E_c + E_p$

Pero podríamos decir que se conserva $E_c + E_p + W_{def} + W_{roz}$

Maquinas Mecánicas

- Transforman trabajo mecánico en trabajo mecánico

En las poleas $W_{ent} = Fs_1$ $W_{sal} = 2Fs_2$

como $s_1 = 2s_2$ tenemos $W_{sal} = W_{ent}$

En la palanca $W_{ent} = Fs_1$ $W_{sal} = Ps_2$

como consecuencia de la igualdad fuerza x brazo

$$W_{sal} = W_{ent}$$

- Eficiencia

$$\eta = \frac{\text{lo que se obtiene}}{\text{lo que se dá}} = \frac{W_{sal}}{W_{ent}} = 100\%$$

Máquinas mecánicas reales

En las máquinas reales la cuerda se estira, la palanca se deforma

por tanto $W_{ent} > W_{sal}$

$$\eta < 100\%$$

La eficiencia es siempre inferior al 100%.

Parte del trabajo se emplea en deformar la cuerda o la barra.

Móvil Perpetuo

Maquina que realiza trabajo indefinidamente sacando energía de la nada

Móvil Perpetuo

Durante siglos se hicieron cientos de prototipos sin que ninguno llegara a funcionar.

El calor

- Distinción entre calor y temperatura.
- Fenómenos térmicos. [Teoría del calórico](#)
"Fluido sutil que pasa de los cuerpos calientes a los fríos cambiando su temperatura".

Simil del agua:

Temperatura - altura,

Capacidad térmica - Sección del depósito,

Calor - cantidad o volumen de fluido que pasa de uno a otro

$$Q = C\Delta T$$

pero....

- El calor también provoca cambios de estado de agregación (sólido-líquido-gas) sin cambio de temperatura.
- El trabajo de rozamiento crea calor, tanto como se quiera (Rumford)

Equivalencia Calor-Trabajo

- Joule-Mayer. Demuestran la equivalencia **trabajo mecánico - calor - trabajo eléctrico I^2R**
los efectos producidos son los mismos - una elevación de la temperatura.
- El calor es equivalente al trabajo.
- **El calor es una forma de energía.**

Relación entre unidades $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$

Máquinas térmicas.

- El calor puede convertirse en trabajo mecánico .

P.e.: Trabajo de expansión en la dilatación de los gases $\int PdV$

- **Conservación de la energía.** (Primer principio de la termodinámica)

$$W = Q - \Delta U$$

- **Energía interna U** Energía total contenida en un sistema termodinámico.
- **Calor Q y trabajo W** Transferencias de energía entre el sistema y el exterior.

- El móvil perpetuo es imposible. No se puede generar trabajo sin proporcionarle energía (calor) o sin gastar su energía interna

Máquinas térmicas cíclicas.

- Máquinas que proporcionan trabajo de forma continua según les proporcionamos calor.
- Carnot. Las máquinas realizan un ciclo tomando calor de un foco caliente (expansión) y cediendo calor a un foco frío (compresión)
- **Eficiencia o rendimiento**

$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{abs}}} = \frac{Q_{\text{abs}} - Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{abs}}} = 1 - \frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{abs}}} < 100\%$$

- Si una máquina reversible funciona empleando los mismos focos su eficiencia siempre es superior
 - Proceso reversible - Proceso que se puede invertir sin alterar ni el sistema termodinámico ni su entorno. proceso realizado muy lentamente sin viscosidades ni fricciones internas, pasando siempre por estados de equilibrio termodinámico.

$$\eta_{\text{irrev}} < \eta_{\text{rev}} = 1 - \frac{T_{\text{frío}}}{T_{\text{cal}}}$$

Segundo Principio de la Termodinámica

- Clausius y Kelvin. Las máquinas cíclicas necesariamente deben ceder calor a un foco frío.

Es imposible el móvil perpetuo de segunda especie.

- Nuestro entorno con $T=273-300$ K
 - Tiene una enorme energía interna $U = CT$.
 - Pero no se puede emplear para obtener trabajo.
 - Es necesario disponer de un foco frío
 - Enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente consume más trabajo que el que podríamos obtener usándolo como foco frío

- Es necesario ceder calor $\rightarrow \eta < 100\%$
- No todo el calor puede convertirse en trabajo

Hay un rendimiento máximo que depende de la diferencia de temperaturas

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_{\text{frío}}}{T_{\text{cal}}}$$

Entropía

- Etimología. “propio de la evolución, del cambio”
- Se puede definir a partir del calor intercambiado en un proceso reversible

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \quad \Delta S = \int_{\text{rev}} \frac{dQ}{T}$$

- El segundo principio es equivalente a decir que en un proceso espontáneo la entropía total siempre crece, o permanece constante si el proceso es reversible

$$\Delta S \geq 0$$

- Si necesariamente $\Delta S \geq 0$, el calor no puede pasar espontáneamente de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, ya que este proceso disminuye la entropía.
- Si espontáneamente el calor pudiera pasar de un cuerpo frío a uno caliente podríamos construir un móvil perpetuo de segunda especie, empleando un solo foco de calor.

(devolviendo al foco caliente el calor cedido al foco frío)

- El tiempo avanza en la dirección de la entropía creciente.

Entropía y trabajo

- Si en un ciclo reversible introducimos procesos irreversibles obtenemos menos trabajo. La diferencia es proporcional a la generación de entropía.

- El trabajo generado cuando solo tenemos la máquina reversible es

$$W_o = \eta_{\text{rev}} Q_{\text{abs}} = \left(1 - \frac{T_{\text{frio}}}{T_{\text{cal}}} \right) Q_{\text{abs}}$$

- Si introducimos un foco intermedio el trabajo es ahora

$$W = \eta_{\text{rev}} Q_{\text{abs}} = \left(1 - \frac{T_{\text{frio}}}{T_{\text{int}}} \right) Q_{\text{abs}}$$

- Se genera una entropía

$$\Delta S = -\frac{Q_{\text{abs}}}{T_{\text{cal}}} + \frac{Q_{\text{ced}}}{T_{\text{frio}}} = -\frac{Q_{\text{abs}}}{T_{\text{cal}}} + \frac{Q_{\text{abs}}}{T_{\text{int}}} > 0$$

- Hemos perdido un trabajo

$$W_{\text{perd}} = W_o - W = T_{\text{frio}} \left(\frac{1}{T_{\text{int}}} - \frac{1}{T_{\text{cal}}} \right) Q_{\text{abs}} = T_{\text{frio}} \Delta S$$

Máquinas térmicas

- No todo el calor puede convertirse en trabajo.

La transformación calor-trabajo tiene una eficiencia posible máxima

$$\eta \leq \left(1 - \frac{T_{\text{frio}}}{T_{\text{cal}}} \right)$$

- Desde el punto de vista práctico

$$T_{\text{frio}} \approx 300 \text{ K} \quad T_{\text{cal}} \approx 1500 \text{ K} \quad \eta \leq \frac{4}{5} = 80\%$$

- Los ciclos reales son irreversibles.
- Los procesos irreversibles aumentan la entropía del entorno y disminuyen el trabajo obtenido

$$W_{\text{perd}} = T_{\text{frio}} \Delta S$$

- La energía se degrada al generar entropía. Podemos hablar de ‘calidad’ de la energía

Mecánica Estadística

- Un gas es un conjunto de moléculas que se mueven al azar en todas direcciones chocando entre sí y con las paredes.
- **Presión** - impacto de las moléculas contra la pared
- **Energía interna** - suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las moléculas
- **Temperatura** - energía cinética media por molécula

$$\left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} kT$$

- **Conducción de calor** entre partes calientes y frías - intercambio de energía cinética por colisiones.
- **Primer principio** - conservación de la energía en las colisiones elásticas entre moléculas y con las paredes.

Entropía y Mecánica Estadística

Entropía

desorden en la distribución molecular

Paso de estado ordenado a estado desordenado **es altamente probable**

Paso de estado desordenado a estado ordenado **es altamente improbable.**

El segundo principio - es casi infinitamente improbable que la entropía disminuya espontáneamente en el Universo

Energía Cinética y Térmica

- La velocidad de las moléculas la podemos expresar relativa al centro de masas

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{cm} + \vec{v}_{irel} \quad \vec{v}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

- En un sólido es similar pero con la energía térmica debida a las vibraciones moleculares.

Energía cinética
Movimiento ordenado

$$\frac{1}{2} M v_{cm}^2$$

Energía Térmica
Desorden microscópico

$$\left\langle \frac{1}{2} m v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} kT$$

Energía química.

- Teoría atómica.

Sustancias químicas compuestas por átomos.

- Reacción química

Los átomos cambian de molécula. Se conserva el número de átomos.

- Ley de Conservación de la Masa

Lavoisier " La masa se conserva en cualquier reacción o cambio químico"

$$m_A + m_B = m_C + m_D$$

- Hay reacciones químicas que desprender calor - Exotérmicas (combustión)
- Hay reacciones que necesitan recibir calor para producirse - Endotérmicas

- Energía química

Energía de enlace - energía potencial del campo de fuerzas que mantiene los átomos unidos en moléculas.

Energía Eléctrica

- Interacción electrostática

campo conservativo de fuerzas
energía potencial

$$E_p = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r} = qV$$

- Puede acumularse energía en un condensador

$$E = \frac{1}{2} Cq^2$$

- Corrientes eléctricas. La energía potencial no se convierte íntegramente en energía cinética ordenada de las cargas. Resistencia eléctrica similar al rozamiento.

$$P = IV = I^2R$$

Trabajo por unidad de tiempo, necesario para mover las cargas a lo largo de un conductor venciendo la resistencia

- Las corrientes generan campos magnéticos Su energía puede acumularse en una autoinducción

$$E = \frac{1}{2} LI^2$$

al conectar un circuito tarda en iniciarse la corriente,
al desconectar el circuito sigue circulando corriente un cierto tiempo

Conservación de la energía

- Se conservan:
la energía mecánica, el calor, la energía química.
- La energía animal y el calor animal se deben a la energía química que procede básicamente de la oxidación o combustión de los hidratos de carbono.
- Young emplea por primera vez el término energía para referirse tanto a la energía mecánica como a la energía animal
- Helmholtz. Principio de conservación de la energía totalmente general, incluyendo todos los fenómenos naturales animados e inanimados.
 - La energía del universo es una constante fija.
 - Todo lo que ocurre, todo lo observable siempre es una transformación de la energía de una de sus formas a otra.