


**HOJA DE PROBLEMAS 5**

---

1. Una v.a. bidimensional  $(X, Y)$  tiene una fdp de valor constante en la zona A de la figura y nulo en el resto.



- a) Demostrar que las v.a.'s  $X$  e  $Y$  están incorreladas.
- b) ¿Son  $X$  e  $Y$  independientes?
- c) Se aplica la transformación:  $Z=X\cos(\theta)-Y\sin(\theta)$ ,  $W=X\sin(\theta)+Y\cos(\theta)$ , siendo  $\theta$  una constante real ( $0=\theta=2\pi$ ); determinar el valor de esta constante para el cual la covarianza de las v.a.'s  $Z$  y  $W$  sea máxima.
- d) Para la transformación del apartado anterior, calcular la relación que debe existir entre las constantes  $a$  y  $b$  para que la covarianza de las v.a.'s  $Z$  y  $W$  sea nula, independientemente del valor de  $\theta$ .

2. Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a.'s cuyas medias son  $\eta_x$  y  $\eta_y$ , y sus desviaciones típicas  $\sigma_x$  y  $\sigma_y$  respectivamente. El coeficiente de correlación de las dos v.a.'s es  $r$ . Sobre  $X$  e  $Y$  se aplica la transformación  $U=X\cos(\theta)-Y\sin(\theta)$ ,  $V=X\sin(\theta)+Y\cos(\theta)$  siendo  $\theta$  una constante real ( $0=\theta=2\pi$ ). Se pide:

- a) Determine el valor de  $\theta$  que hace que las v.a.'s  $U$  y  $V$  estén incorreladas.
- b) Suponga que  $X$  es  $N(\eta_x, \sigma_x)$  e  $Y$  es  $N(\eta_y, \sigma_y)$ , siendo  $X$  e  $Y$  independientes; si sobre ellas se aplica la transformación anterior, determine las fdp's marginales de las v.a.'s  $U$  y  $V$ .


3. Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a.'s uniformes en el intervalo  $(0,1)$  e independientes. Se forma la v.a.  $U=(-2\ln X)^{1/2}$ .

- a) Calcular la fdp de la v.a.  $U$  y la fdp conjunta de  $U$  e  $Y$ .
- b) Se definen las v.a.'s  $Z=U\cos(2\pi Y)$ ,  $W=U\sin(2\pi Y)$ . Calcular las f.d.p.'s conjunta y marginales de las v.a.'s  $Z$  y  $W$ .

4. Un móvil avanza en línea recta en instantes discretos de tiempo; en cada instante tiene una probabilidad  $p$  de avanzar 1 metro y  $q = 1-p$  de permanecer parado. Se consideran 2 instantes de tiempo consecutivos y se definen las v.a.'s  $\mathbf{X}$ : "distancia avanzada sólo en el primer instante" e  $\mathbf{Y}$ : "distancia avanzada en los dos instantes".

- Obtener las probabilidades de los puntos del rango o recorrido de la v.a. bidimensional  $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  y las probabilidades marginales de  $\mathbf{X}$  e  $\mathbf{Y}$ . ¿Son estas v.a.'s independientes?
- Calcular el coeficiente de correlación de  $\mathbf{X}$  e  $\mathbf{Y}$  y el estimador lineal óptimo de  $\mathbf{Y}$  en función de  $\mathbf{X}$ . ¿Son  $\mathbf{X}$  e  $\mathbf{Y}$  incorreladas?
- Obtener el estimador óptimo (sin restricciones) de  $\mathbf{Y}$  en función de  $\mathbf{X}$ .

5. En el esquema de la figura,  $\mathbf{Y}$  representa una tensión desconocida e inaccesible que sufre una atenuación también desconocida,  $\mathbf{G}$ , de forma que sólo se puede obtener medidas de  $\mathbf{X} = \mathbf{G}\mathbf{Y}$ . Tanto  $\mathbf{Y}$  como  $\mathbf{G}$  pueden suponerse uniformes en  $(0,1)$  e independientes. Se trata de estimar  $\mathbf{Y}$  a partir de  $\mathbf{X}$  mediante los dos bloques de la figura:



- Obtener las constantes  $a$  y  $b$  del bloque superior, de forma que  $\hat{\mathbf{Y}}_1$  sea la estimación lineal de  $\mathbf{Y}$  de mínimo error cuadrático medio.
- Obtenga la función  $g(x)$  del bloque inferior que hace que  $\hat{\mathbf{Y}}_2$  sea la estimación no lineal de  $\mathbf{Y}$  de mínimo error cuadrático.
- Calcule el coeficiente de correlación de  $\mathbf{X}$  e  $\hat{\mathbf{Y}}_1$  y la covarianza de  $\mathbf{X}$  e  $\hat{\mathbf{Y}}_2$ .

6. Sean  $\mathbf{X}_1$  y  $\mathbf{X}_2$  dos v.a.'s  $N(0, \sigma_1)$  y  $N(0, \sigma_2)$  respectivamente, ( $\sigma_1 > \sigma_2$ ). Se forma la nueva v.a.  $\mathbf{Z} = \mathbf{Y}\mathbf{X}_1 + (1-\mathbf{Y})\mathbf{X}_2$  donde  $\mathbf{Y}$  es una v.a. de Bernoulli de parámetro  $p$  ( $\mathbf{X}_1$ ,  $\mathbf{X}_2$  e  $\mathbf{Y}$  son independientes entre sí). Se pide:

- La función densidad de probabilidad de  $\mathbf{Z}$ .
- La media y la varianza de  $\mathbf{Z}$ .
- A partir del conocimiento de  $\mathbf{X}_2$ , los estimadores lineal cuadrático medio óptimo y cuadrático medio óptimo sin restricciones de  $\mathbf{Z}$ .

7. El tiempo en milisegundos necesario para transferir un archivo de datos desde una unidad de disco a la memoria central de un ordenador puede modelarse como una v.a.  $Z$ , que es de la forma  $Z=X+cY$ , donde  $X$  es el tiempo que tarda la cabeza lectora en colocarse al principio del archivo,  $Y$  el tamaño en Kbytes de éste y  $c$  una constante. Supondremos  $X$  uniforme entre 30 y 50 ms,  $Y$  normal de media  $\eta_Y=100$ Kbytes, desviación típica  $\sigma_Y=10$  Kbytes e independiente de  $X$  y  $c=0.5$ msg/Kbyte. Calcule:

- a) La media y la varianza de  $Z$  y el coeficiente de correlación de  $Y$  y  $Z$ .
- b) La fdp de  $Z$ .
- c) Los estimadores lineal y no lineal óptimos (recta y línea de regresión respectivamente) de  $Z$  en función de  $Y$ .

8. Se lanza un dado 6000 veces. Calcular, realizando las aproximaciones que considere necesarias:

- a) La probabilidad de que el número de veces que salga 1, está comprendida entre 980 y 1005.
- b) La probabilidad de que el número de veces que salga 1 sea 1005.