

## **4.2 Infecciones de la Mama. Hipertrofia Mamaria y Gigantomastia**

Fernando Hernanz

- INFECCIONES DE PARTES BLANDAS
- GÉRMENES:
  - Cocos GRAM +
    - Staphylococcus Aureus
    - Streptococcus Pyogenes

- **MASTITIS INFECCIOSAS**
  - Infección del parénquima glandular, tejidos de soporte y cobertura (piel) y tejidos de relleno (graso)
  - Clasificación:
    - Agudas, subagudas y crónicas.
    - Puerperales y fuera de la lactancia.

- **MASTITIS INFECCIOSA PUERPERAL**
  - Clasificación:
    - Mastitis infecciosa epidémica hospitalaria.
    - Mastitis no epidémica o esporádica.
- **INFECCIONES, ACCESOS Y FÍSTULAS**
  - Etiología:
    - Metaplasia pavimentosa (de epitelio cilíndrico a escamoso) que causa descamación y taponamiento por queratina
  - Pezón invertido

- CLÍNICA
  - DOLOR MAMARIO
  - SECRECIÓN POR EL PEZÓN
  - SIGNOS INFLAMATORIOS LOCALES
  - SÍNTOMAS SISTÉMICOS
    - Fiebre
    - Malestar general

- **DIAGNÓSTICO**
  - Diferencial con Carcinoma Inflamatorio
  - ECOGRAFÍA
    - Punción y evacuación de abscesos
    - Seguimiento

- Otras Infecciones:
  - HIDROSADENITIS SUPURATIVA DE LA AREOLA
  - TUBERCULOSIS MAMARIA
  - INTERTRIGO CANDIDIASICO MAMARIO

- **Clasificación de Lalardrie y Jouglard**

– Ideal	250-300 cc
– Hipertrofia Moderada	400-600
– Hipertrofia Importante	600-800
– Hipertrofia severa	800-1000
– Gigantomastia	>1.500

- Clínica:
  - Dolor cérico-dorsal.
  - Intertrigos en surcos mamarios.
  - Posiciones viciosas en la bipedestación.
  - “Marcas” del sujetador en los hombros .
  - Transtornos Psicológicos: Complejos, aislamiento, etc.
  - Otros: Dificultad para realizar actividades físicas, impedimentos.

## Indicaciones de Mamoplastia de Reducción en nuestro centro

- Distancia pezón-horquilla esternal >32 cms.
- Necesidad de extracción de >1500 grs. por mama.
- Cifosis estructural
- Repercusión mental grave



