

- **Mujer de 36 años** de edad que consulta por **hipoacusia de oído izquierdo** de 8 meses de evolución. Refiere episodios frecuentes de **otorrea** por dicho oído. Multitratada y vista por varios ORL.
- AP: aparentemente sin interés
- Exploración: otoscopia con aspecto de omc
- Resto exploración ORL sin interés.





TUBERCULOSIS DE OIDO

- Abes GT, Abes FL, Jamir JC. The variable clinical presentation of tuberculosis otitis media and the importance of early detection. *Otol Neurotol* 2011;32:539-43.
- 12 pacientes: 5 con perforaciones múltiples, perforación simple con tejido de granulación y ligera otorrea, perforación simple sin otorrea o tejido de granulación, membrana íntegra con aspecto de otitis serosa y membrana íntegra con aspecto de tumor en oído medio.

TUBERCULOSIS DE OIDO

- **Complicaciones serias y frecuentes secuelas si no se realiza un diagnóstico temprano**
- Oberdorfer P, et al. A 14-year-old girl with tuberculous otitis media and brain abscess. *BMJ Case Rep* 2012;24:201.
- Dumas G, Schmerber S, Atallah I, Brion JP, Righini CA. Subacute tuberculous otitis media complicated by petrositis and meningitis. *Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord)*. 2012;133:221-4.