


- **Mujer de 27** años de edad que presenta hipoacusia bilateral y mareos **de 7 meses de evolución**. Multitratada sin mejoría.
- **AP: Sin interés**
- Exploración: membrana timpánica engrosada y retraída bilateralmente. Resto de exploración ORL normal.

- Audiometría con hipoacusia mixta bilateral.



- TC y RM: ocupación de oído medio y mastoides bilateralmente





- Se le diagnostica una otitis serosa, con afectación de oído interno asociada, que no mejora con múltiples tratamientos médicos, ni con drenajes transtimpánicos.

- La paciente está desesperada y su ORL también. Se la ingresa (tratamiento antibiótico ev y corticoides).
- Interconsulta con MI: no objetiva patología sistémica.

- Uno de los múltiples médicos que la ven comenta que cree que tiene un Síndrome de Münchausen

Síndrome de Munchausen



- Trastorno psiquiátrico que se caracteriza por **inventar dolencias para asumir el papel de enfermo.**
- El paciente lo hace con síntomas físicos o psicológicos fingidos o **producidos intencionadamente.**
- El origen de su motivación y su necesidad de llamar la atención **no son conscientes para el paciente.**

Síndrome de Munchausen y ORL

*Griffiths H, Cuddihy PJ, Marnane C. Bleeding ears: a case of Munchausen syndrome by proxy. **Int J Pediatr Otorhinolaryngol** . 2001 Mar;57(3):245-7.*

*Cohen NL, Breda SD, Lebowitz AS. Otogenic Munchausen syndrome. **Am J Otol**. 1990 ;11(3):192*

*Zohar Y, Avidan G, Shvili Y, Laurian N. Otolaryngologic manifestations of Munchausen's syndrome. **Laryngoscope**. 1987 Feb;97(2):201-3.*

¿hacemos un pase a psiquiatría y
dejamos el casos cerrado?

- Finalmente, nos olvidamos del Münchhausen, ya que la patología de oído de la paciente es imposible que sea autoprovocada, se pide un test para anticuerpos ANCA (anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos) que son positivos, diagnóstico: Granulomatosis de Wegener.

Granulomatosis de Wegener

- Principales formas de presentación en ORL
 - Síntomas nasosinusales (esta es la forma principal de presentación, tenéis varios casos del aula virtual relacionado con esto)
 - Patología ótica que no cede con tratamiento
 - Estenosis subglótica (ver caso New England)

Manifestaciones otorrinolaringológicas en pacientes con granulomatosis de Wegener (granulomatosis con poliangitis) Acta Esp Otorrinolaringol 2012;63:206-11.

Granulomatosis de Wegener

- Enfermedad sistémica.
- Cursa con frecuencia con patología de vías aéreas altas (ORL)
- Nefropatía
- Patología pulmonar
- Patología articular
- Otras...

Granulomatosis de Wegener

- Importante realizar un diagnóstico precoz para evitar secuelas.

- Aunque la G. de Wegener o Granulomatosis con Poliangeitis es una enfermedad muy poco frecuente, la tenéis que conocer bien porque entra en el diagnóstico diferencial de muchas patologías . La daréis en varias especialidades.

- Lo importante de este caso, además de que conozcáis la G. de Wegener, es que cuando una persona joven, sin antecedentes previos de una patología de oído medio empieza, sin desencadenante alguno, con patología muy severa de oído, que no responde a tto, hay que empezara pensar en cosas raras. Sin embargo, la presentación típica del Wegener, no lo olvidéis, es la patología nasosinusal (aprovechar para mirar algún caso de los seleccionados para examen en la parte de rinología).