### HERPES ZOSTER DEL V PAR

16-1-20014

• Enfermero de 43 años de edad, sin antecedentes de interés, que consulta por odontalgia inferior derecha de 3 días de evolución. Antes de ser visto por su odontólogo comienza con dolor facial derecho (áreas de las 3 ramas del V par), de carácter punzante, muy intenso.

• Coindidiendo con el inicio del dolor facial le aparece unas úlceras dolorosas en la cara interna de la mejilla derecha, Poco después aparecen lesiones cutáneas en el área del Vpar (V1, V2, V3).





• Se inicia tratamiento con fanciclovir cada 8 horas y analgesia con ibuprofeno alternando con adolonta.

#### HERPES ZOSTER DEL V PAR

- La mayor parte de las infecciones por Herpes Zóster tienen lugar en dermatomas torácicos o lumbares.
- Un 13% de los casos aparecen en las ramas del Vpar (todas las ramas o de forma aislada en alguna de ellas).

## Reactivación del virus de la Varicella Zóster(VZV)

- La reactivación del VZV puede aparecer espontáneamente, o ser secundario a una disminución de las defensas.
- La edad avanzada, traumatismo (incluida la manipulación dental), stress psicológico, neoplasias malignas, radioterapia y estados de inmunosupresión, son factores predisponentes.

#### Incidencia

- 1.5-3/1000 habitantes
- 10/1000 en mayores de 75 años.

#### **Estadios**

- 1. Pródromos: quemazón ,pinchazos, dolores.... En dermatoma afecto
- 2. Fase Activa: Aparición de Rash (pápulas rojizas, vesículas, pústulas). Fase más contagiosa.
- 3. Fase de cronificación (10%): postherpectic neuralgia. Dolor que dura más de 3 meses.

# Complicaciones (mayor riesgo en inmunodeprimidos)

- Neuralgia postherpética (10 %)
- Meningoencefalitis. Meningitis aséptica
- Uveitis-queratitis
- Sobreinfección bacteriana. Celulitis-Impetigo
- Bronquitis, pleuritis

#### **Tratamiento**

- Resolución espontánea.
- En fase precoz: antivirales: disminuye los síntomas agudos, limita la extensión y duración de la enfermedad y prevenir complicaciones.
- Aciclovir 800mg 5/día, Valaciclovir 1000mg 3/día, famciclovir 500mg 3/día
- Iniciar el tratamiento lo antes posible.