

Otorrinolaringología

Examen con imágenes




Carmelo Morales Angulo

Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas


Este tema se publica bajo Licencia:

[Creative Commons BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

1. ¿Qué estructura señala la flecha?
¿Qué oído es este: derecho o izquierdo?



**2. ¿Cuál es su diagnóstico?
¿A qué se puede asociar?**



- 3. Paciente de 81 años de edad con antecedente de sinusitis crónica (mucosidad nasal purulenta de repetición por fosa nasal derecha) que consulta porque desde hace 4 días se le ha puesto el ojo como vemos en la imagen.
¿Cuál es su diagnóstico más probable?**



4. Paciente de 25 años de edad que consulta porque desde hace una semana, coincidiendo con una infección de vas le ha aparecido esto en el cuello.

¿Cuál es su probable diagnóstico?



5. Paciente de 58 años de edad que consulta por la aparición de las lesiones de la foto desde hace 1 mes. Se realiza una extirpación en cuña: ¿diagnóstico anatomopatológico?



6. Diga tres posibles causas de lo que se ve en la imagen.



7. Paciente roncadador que consulta porque se ha levantado por la mañana con dolor de garganta. ¿Cuál es su diagnóstico? Nombre otras 3 posibles causas.



**8. Tras una cirugía cervical izquierda la paciente presenta la imagen de la foto.
¿Qué ha pasado?**



9. ¿Qué intervención quirúrgica ha provocado la complicación de este paciente?



**10. Paciente con dolor de garganta que en la exploración se ve la imagen adjunta.
¿Cuál es su diagnóstico?**



11. Paciente de 63 años, sin antecedentes de interés, que acude por la aparición de una tumoración subauricular de 3 días de evolución. No refiere fiebre.

Se objetiva la lesión de la foto. Al tacto es depresible y muy dolorosa. ¿Qué harías?



12. En ausencia de un cuadro infeccioso asociado u otro desencadenante claro, si vemos esta imagen en un niño que debemos descartar?



13. Varón de 70 años de edad, muy fumador, con enolismo crónico, que consulta por ligera odinofagia de 2 meses de evolución.

En la exploración ORL se objetiva la imagen de la diapositiva y una adenopatía laterocervical derecha. ¿Qué es lo primero que haría?



- 14. Varón de 34 años de edad, sin antecedentes de interés, que refiere la aparición recurrente de lesiones similares a las de la foto desde hace años. Son muy dolorosas.**
¿Cuál es el diagnóstico más probable?



15. Varón de 40 años de edad, sin antecedentes de interés, que consulta porque tras una infección de vías aéreas superiores presenta tos irritativa persistente de un mes de evolución. La exploración ORL es normal salvo lo que se ve en la imagen adjunta.


¿Cuál es su diagnóstico?




16. Paciente de 28 años de edad, sin antecedentes de interés, que consulta por odinofagia y fiebre de 72 h de evolución sin mejoría con antibióticos. ¿Cuál es su diagnóstico?



17. Nombre una posible causa.



**18. Varón de 27 años de edad con SAHS. Acude a ORL porque no tolera la CPAP.
¿Qué le hacemos?**



**19. A esta niña de 14 años le han colocado un implante coclear bilateral.
¿Cómo se llama el síndrome que padece?**



20. ¿Cuál es la causa más frecuente de la imagen?



**21. Paciente de 70 años con antecedente de carcinoma de orofaringe tratado con radioterapia. Refiere molestias orofaríngeas. Al raspar las lesiones de la foto, estas se desprenden.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?**



**22. ¿Cómo se llama lo que tiene este paciente?
¿A qué síndrome se suele asociar?**

